

# SCHEDA INFORMATIVA VACCINO HERPES ZOSTER

## Quale malattia previene?

L'**Herpes Zoster (HZ)**, conosciuto anche come "fuoco di Sant'Antonio", è una patologia comune e debilitante causata dalla riattivazione del virus della Varicella-Zoster (VZV), contratto generalmente nel corso dell'infanzia. Dopo tale infezione, il virus non viene eliminato dall'organismo, ma rimane al suo interno e può riattivarsi con lesioni di tipo vescicolare. Le lesioni possono durare qualche settimana prima di scomparire e dopo la sua guarigione può persistere un dolore localizzato che può durare mesi o anni, tale complicanza è definita nevralgia post erpetica.

## Quali sono le caratteristiche del vaccino?

È disponibile il vaccino ricombinante adiuvato. Il vaccino stimola il sistema immunitario ad agire specificamente contro il virus. Il vaccino è indicato per la prevenzione dell'Herpes Zoster e della nevralgia post-erpetica. Il vaccino può essere somministrato anche a chi abbia già ricevuto la vaccinazione anti-herpes zoster con il vaccino vivo attenuato.

## Come si somministra?

La somministrazione prevede 2 dosi a distanza di 2 mesi (da 1 a 2 mesi nei soggetti che sono o che potrebbero diventare immunodeficienti o immunodepressi a causa di malattia o terapia). La somministrazione avviene per via intramuscolare nella parte alta del braccio.

## Per chi è indicata questa vaccinazione?

La vaccinazione anti-Herpes Zoster è fortemente raccomandata poiché riduce il rischio di sviluppare la malattia e la nevralgia post-erpetica ed è rivolta alle persone a 65 anni di età ed alle persone di età superiore ai 18 anni con particolari condizioni di salute, che dovranno essere valutate con il suo Medico.

## In quali casi si deve rinviare la vaccinazione?

È opportuno rimandare la vaccinazione in presenza di malattie acute febbrili o disturbi generali giudicati importanti dal medico.

## In quali casi non si può fare la vaccinazione?

La vaccinazione è controindicata nei soggetti che hanno manifestato gravi reazioni allergiche (shock anafilattico) al vaccino o a uno dei suoi componenti.

## Quali sono i possibili effetti indesiderati?

Le reazioni avverse più comuni sono reazioni al sito di iniezione (eritema, gonfiore, prurito, dolorabilità o indurimento), mal di testa. La maggior parte di queste reazioni sono state riportate come lievi per intensità.

Nel caso in cui si manifestino effetti indesiderati di gravità superiore a quelli descritti, rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Non si può escludere il verificarsi di una reazione allergica grave (anafilassi) dopo somministrazione di qualsiasi vaccino pur essendo un evento eccezionale

## Cosa fare dopo la vaccinazione?

Rispettare un tempo di osservazione post-vaccinale di quindici minuti.

A domicilio in caso di dolore nella sede di iniezione e/o di febbre può essere somministrato un antidolorifico/antipiretico, il cui dosaggio dipende dall'età e dal peso del bambino/adulto; in caso di gonfiore/rossore in sede di iniezione si raccomanda di non massaggiare la zona e di applicare un panno imbevuto di acqua fresca.