

CIPOLLA DORATA DI VOGHERA

DENOMINAZIONE BOTANICA

Allium cepa L. (Cipolla)

varietà Dorata di Voghera.

ORIGINE

Già nel XIX secolo la Cipolla Dorata era diffusa nelle campagne del vogherese, dove veniva messa in rotazione con cereali e foraggere. Dotata di produttività costante, unita a una buona tolleranza verso le principali patologie tipiche di questa specie, è stata esportata in altri areali (1896, Parma).

Il recupero e la valorizzazione della varietà sono iniziati negli inizi degli anni '90 del XX secolo con la costituzione del consorzio Produttori e la messa a punto del disciplinare di produzione.

DESCRIZIONE

Il bulbo della Cipolla Dorata di Voghera ha una forma a trottola leggermente schiacciata, un diametro medio di 6-7 cm e un colore giallo dorato intenso. Un alto grado di pungenza si associa a spiccata rusticità e straordinaria conservabilità.

COLTIVAZIONE

La coltivazione della cipolla dorata di Voghera avviene in terreni piuttosto tenaci e pesanti, a reazione alcalina o sub-alcalina con una dotazione sufficiente in sostanza organica e livelli elevati di fosforo, potassio e magnesio. Si utilizzano rotazioni di 5 anni con cereali e foraggere.

La semina avviene a fine inverno con 60-70 piantine mq. Le cure colturali sono quelle classiche della cipolla con particolare attenzione all'irrigazione, generalmente molto limitata dalla fioritura in poi, e alla difesa fitosanitaria. La raccolta avviene normalmente nel mese di luglio, quando si provvede all'estirpo e all'andanatura dei bulbi.

ZONA IN CUI È CONSIGLIATA LA COLTIVAZIONE

Comuni di Voghera, Casei Gerola, Silvano Pietra e Montebello della Battaglia in provincia di Pavia e Pontecurone in provincia di Alessandria.

ALTRO

Istituzione della De.C.O. approvata dal Consiglio Comunale il 22/10/2008.

Varietà inserita nell'elenco dei prodotti tradizionali della Regione Lombardia e nel Paniere pavese.

Varietà iscritta alla sezione "varietà da conservazione" del registro nazionale delle varietà di specie agrarie e ortive con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 12 ottobre 2015.



Scheda di caratterizzazione morfologica - Cipolla (*Allium cepa* L.)
Varietà Dorata di Voghera

N. GIBA	CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETÀ DI RIFERIMENTO
1 GIBA	1 (*)	PIANTA: numero di foglie per falso stelo	X	basso	
			5	medio	
			7	alto	
2 GIBA	2	FOGLIAME: portamento	1	eretto	
			X	da eretto a semieretto	KeepWell
			3	semieretto	Southport Red Globe
			4	da semieretto a orizzontale	Hygro
			5	orizzontale	
3 GIBA	3	FOGLIAME: glaucescenza	1	assente o molto lieve	
			3	lieve	Yellow sweet spanish
			5	media	Hikeeper
			X	forte	Cillypso, Flevo
			9	molto forte	
4 GIBA	4 (*)	FOGLIAME: intensità colore verde	1	molto chiaro	
			3	chiaro	Guimar ,Yellow sweet spanish
			X	medio	Caribo, Texas grano 502
			7	scuro	Hikeeper, La Reine
5	5	FOGLIAME : piegatura	X	assente o molto lieve	Golden Bear
			2	intermedia	Hyduro
			3	forte	
6.1	6.1	FOGLIA: lunghezza	1	molto corta	Barletta, Pompei
			3	corta	Nocera
			5	media	Jetset
			X	lunga	
			9	molto lunga	The Kelsae
7.1 GIBA	7.1	FOGLIA: diametro	3	piccolo	Nocera, Paris
			5	medio	Hyfast
			X	grande	Dorata di Parma
8	8	FALSO STELO: lunghezza	3	corto	Barletta
			5	medio	Hyduro, The Kelsae
			X	lungo	Goldito
9	9	FALSO STELO: diametro	3	piccolo	
			5	medio	Calypso, La Reine
			X	grande	Bianca grande tardiva de Lérida, The Kelsae
10 GIBA	10 (*) (a)	BULBO: tendenza alla separazione in bulbilli (con scaglie secche che coprono ogni bulbillo) <small>SOLO PER VARIETÀ PROPAGATE PER SEME</small>	X	assente o molto lieve	Cuisse de Poulet du Poitou, Lagos
			3	lieve	
			5	media	
			7	forte	
			9	molto forte	
12.1 GIBA	12.1 (*)	BULBO: taglia	3	piccola	
			X	media	Lagos
			7	grande	The Kelsae
13.1 GIBA	13.1	BULBO: altezza	1	molto basso	Prompto
			3	basso	Nocera, Stuttgarter Riesen
			X	medio	Golden Bear
			7	alto	Birnformige, The Kelsae
			9	molto alto	Cuisse de Poulet du Poitou
14.1 GIBA	14.1	BULBO: diametro	3	piccolo	Nocera, Owa
			X	medio	
			7	grande	Stuttgarter Riesen

N. GIBA	CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETÀ DI RIFERIMENTO
15.1 GIBA	15.1	BULBO: rapporto altezza/diametro	1	molto basso	Pompei
			3	basso	La Reine
			X	medio	Valenciana Temprana
			7	alto	The Kelsae
			9	molto alto	Owa
16 GIBA	16	BULBO/BULBILLO: posizione massimo diametro	1	verso l'apice	Dorata di Parma, Texas grano 502
			X	al centro	Valenciana tardia de exportacion
			3	verso la base	The Kelsae
17	17	BULBO/BULBILLO: larghezza del colletto	1	molto stretto	
			3	stretto	La Reine
			X	medio	Hyduro
			7	largo	Bianca grande tardiva de Lérida
			9	molto largo	
18 GIBA	18 (*)	BULBO/BULBILLO: forma generale (in sezione longitudinale)	1	ellittica	Owa
			2	ovata	Birnformige, Rossa lunga di Firenze
			3	ellittica larga	Ailsa Craig, Beacon, Hiball
			4	arrotondata	Lagos
			5	ovata larga	Hysam
			6	obovata larga	Lilia, Texano grano 502
			X	a rombo	Zittauer gelbe
			8	ellittica trasversale	Sturka, Stuttgarter Riesen
19 GIBA	19	BULBO/BULBILLO: forma dell'apice (in sezione longitudinale)	9	ellittica	Brunswijker, De Moissac, Paille des vertus, Pompei
			1	depresso	Dorata di Parma
			2	appiattito	La Reine
			3	leggermente	Valenciana Temprana
			X	arrotondato	Valenciana tardia de exportacion
			5	leggermente appuntito	Ailsa Craig, Rouge pale de Niort
20 GIBA	20	BULBO/BULBILLO: forma della base (in sezione longitudinale)	6	fortemente appuntito	Owa
			1	depressa	Paille des vertus
			2	appiattita	Valenciana Temprana, Nocera
			X	arrotondata	Valenciana tardia de exportacion
			4	leggermente conica	Pompei, The Kelsae
21	21	BULBO/BULBILLO: aderenza delle scaglie secche dopo la raccolta	5	fortemente conica	Owa
			3	debole	Ailsa Craig
			X	media	Rijnsburger 7
22	22	BULBO/BULBILLO: spessore delle scaglie secche	7	forte	Stuttgarter Riesen
			3	sottile	La Reine
			5	medio	Sturon
23 GIBA	23 (*)	BULBO/BULBILLO: colore di fondo delle scaglie secche	X	spesso	Birnformige, Espagnol
			1	bianco	Pompei, La Reine
			2	grigio	
			3	verde	
			X	giallo	Zittauer gelbe
			5	marrone	Valenciana Temprana
			6	rosa	Colorada de Figueras
24 GIBA	24	BULBO/BULBILLO: intensità del colore di fondo delle scaglie secche	7	rosso	Brunswijker, Red Baron
			3	chiaro	
			5	medio	
			X	scuro	

N. GIBA	CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO DI ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETÀ DI RIFERIMENTO
25 GIBA	25 (*)	BULBO/BULBILLO: sfumature del colore delle scaglie secche (in aggiunta al colore di fondo)	1	assenti	Pompei
			2	grigiastre	
			3	verdastre	
			X	giallastre	
			5	brunastre	
			6	rosee	
			7	rossastre	
			8	purpuree	
26 GIBA	26	BULBO/BULBILLO: colore dell'epidermide delle scaglie interne	X	assente	
			2	verdastro	Sturon
			3	rossastro	Brunswijker
27 GIBA	27 (*)(a)(b)	BULBO/BULBILLO: numero di punti vegetativi per kg	1	molto basso	Barletta, Pompei
			X	basso	Cuisse de Poulet du Poitou, Figaro, Owa
			5	medio	
			7	alto	
			9	molto alto	
28 GIBA	28 (*)	BULBO/BULBILLO: contenuto in sostanza secca	1	molto basso	Exhibition
			3	basso	Golden Bear, The Kelsae
			X	medio	
			7	alto	Birnformige, Zittauer gelbe
			9	molto alto	
29	29	Tendenza a montare a seme nelle prove seminate in primavera	1	assente	Desihidrobat
			3	debole	Zittauer gelbe, Stuttgarter Riesen
			5	media	Legio
			X	forte	
			9	molto forte	Bronzé d'Amposta
30	30	Epoca di inizio della montata a seme nelle prove seminate in primavera	3	precoco	Bronzé d'Amposta
			X	media	Legio
			7	tardiva	
34.1 GIBA	34.1 (*)	Epoca di maturazione commerciale nelle prove seminate in primavera (80% delle piante con fogliame reclinato)	3	precoco	Buffalo, Golden bear
			X	media	Piroska
			7	tardiva	Beacon
35	35	Epoca di germogliamento durante lo stoccaggio	3	precoco	Golden Bear, The Kelsae
			X	media	Hygro, Hyper
			7	tardiva	Marion
36 GIBA	36 (*)	Sterilità maschile	1	assente o molto debole	Rijnsburger 5
			X	debole (11-80%)	Hydуро
			3	forte (81-100%)	